


Clinical Remission after induction (8 weeks) and Maintenance (52 weeks)

Double Blind ABX464 50mg versus Placebo (centrally randomised)

Evaluable Patients / N=19



symptomfrei nach 8 Wochen
46,15%

gesamtzahl Patienten
mit Medikament

nicht symptomfrei nach 8 Wochen
54%

gesamtzahl mit
Placebo in den ersten 8 Wochen
Wichtig: Danach Behandlung mit ABX464!

symptomfrei nach 8 Wochen
17%

Weiterbehandlung:

nicht auswertbar, da keine Endoskopie
15,38%

symptomfrei nach 52 Wochen
81,82% bezogen auf die ausgewerteten
Patienten, d.h. mit Endoskopie

symptomfrei nach 52 Wochen
60,00% bezogen auf die ausgewerteten
Patienten, d.h. mit Endoskopie

Fazit:
Insgesamt nahmen 19 Patienten teil. Davon müssen drei aus der Wertung genommen werden, da nach 52 Wochen keine Endoskopie durchgeführt wurde von den 16 ausgewerteten wurden 5+4+3 geheilt, davon 5 die bereits nach 8 Wochen symptomfrei waren nach ABX 464, weitere 4 die mit ABX464 nach 8 Wochen noch nicht Symptomfrei waren und weitere 3, die zunächst Placebo bekamen und anschließend mit ABX 464 behandelt wurden. Somit wurden 75% geheilt.